

	乾燥弱毒生水痘ワクチン (生ワクチン：商品名ビケン)	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン：商品名シングリックス)
ワクチンの特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・発症予防効果 50歳台で69.8%、60歳以上で51.3% ・帯状疱疹後神経痛予防効果 60歳以上は66.5% ・長期予防効果 接種1年以内68.7%、接種8年目4.2% ・副反応の発現率：50.6% 	<ul style="list-style-type: none"> ・発症予防効果 50歳以上で97.2%、70歳以上で89.8% ・帯状疱疹後神経痛の予防効果 70歳以上は85.5% ・長期予防効果 接種10年での発症予防効果は73.2% ・副反応の発現率：(局所)74.1% 【注射部位の痛み、発赤、腫れなどが多い】
	<ul style="list-style-type: none"> ・皮下注射 ・基礎疾患等により打てない場合がある ・接種料が安価で、1回接種のみ 	<ul style="list-style-type: none"> ・筋肉注射 ・接種料が高価で、2回接種。1回目の接種から、2カ月後の接種となる。(2カ月を過ぎても、6カ月以内に接種する)
接種を受けられない方	<ul style="list-style-type: none"> ・化学療法やステロイドなど免疫を抑える治療をしている方 ・免疫力が落ちている方 (HIV感染等) ・妊娠していることが明らかな方 ・水痘ワクチンによる強いアレルギー症状 (アナフィラキシーなど) を起こしたことがある方 ・カナマイシン、エリスロマイシンの抗生剤にアレルギー反応を起こしたことがある方 ・明らかな発熱 (37.5℃以上) がある方や急性疾患に罹っている方 	<ul style="list-style-type: none"> ・帯状疱疹ワクチンによる強いアレルギー症状 (アナフィラキシーなど) を起こしたことがある方 ・明らかな発熱 (37.5℃以上) がある方や急性疾患に罹っている方

出典：国立感染症研究所帯状疱疹ワクチンファクトシート、ワクチン製造メーカーホームページ、乾燥弱毒製水痘ワクチン「ビケン」添付文書（2022年1月改訂第3版）、シングリックス筋注用添付文書（2020年10月改訂第1版）